



Copyright disclaimer

"La faculté" is a website that collects copyrights-free medical documents for non-lucrative use.

Some articles are subject to the author's copyrights.

Our team does not own copyrights for some content we publish.

"La faculté" team tries to get a permission to publish any content; however, we are not able to contact all the authors.

If you are the author or copyrights owner of any kind of content on our website, please contact us on:
facadm16@gmail.com

All users must know that "La faculté" team cannot be responsible anyway of any violation of the authors' copyrights.

Any lucrative use without permission of the copyrights' owner may expose the user to legal follow-up.



MODULE DE MALADIES INFECTIEUSES

1^{er} SEMESTRE 2001 / 2002

EPREUVE DE MICROBIOLOGIE

1. L'infection urinaire peut se localiser (cocher une réponse fausse)
 - a. à la vessie et donner la cystite
 - b. à l'urètre dans l'urétrite
 - c. au parenchyme rénal dans la pyélonéphrite
 - ☒ d. à la prostate dans la prostatite
 - e. ou se présenter sous forme de bactériurie asymptomatique

2. Tous les signes cliniques suivants font penser à une infection urinaire et conduisent à demander un E.C.B.U (cocher la réponse fausse).
 - a. troubles fonctionnels de la miction
 - b. douleurs lombaires, brûlures mictionnelles
 - ☒ c. sensibilité au TR de la prostate
 - d. écoulement urétral purulent
 - e. fièvre inexpliquée

3. Les bactéries anaérobies se distinguent par (cocher la réponse juste)
 - ☒ a. leur capacité à se développer en présence d'O₂
 - b. leur capacité à se développer en présence de CO₂
 - c. leur capacité à se développer en présence d'O₂ + CO₂
 - d. leur incapacité à se développer en présence d'O₂
 - e. leur capacité à se développer en présence de N₂

4. Parmi ces clostridies quel est l'agent de la colite pseudo-membraneuse ? (cocher la réponse juste)
 - a. Clostridium botulinum
 - b. Clostridium perfringens
 - ☒ c. Clostridium difficile
 - d. Clostridium oedematiens
 - e. Clostridium botulinum

5. L'identification du virus polio myélite nécessite les étapes suivantes : (cocher la réponse fausse)
 - a. prélèvement de sècrète ou de L.C.R.
 - b. un isolement viral sur une lignée continue
 - ☒ c. un isolement viral sur souris
 - d. une identification immunologique par la réaction de neutralisation
 - e. la décontamination du prélèvement

6. Le diagnostic virologique de l'infection rabique se fait (Cocher Réponse Juste)
 - a. à partir de la salive
 - b. à partir de signes cliniques observés chez l'animal
 - c. à partir des cellules cérébrales de l'animal enrégé
 - d. par la réaction de neutralisation
 - e. par la réaction de l'inhibition de l'hémagglutination

6 Service A.

2003 + 2002 + 2001 - 2000.

MODULE DE MALADIES INFECTIEUSES
EPREUVE DE MICROBIOLOGIE

9/2003

1. Une Enterobactérie synthétise une BLSE (Betalactamase à spectre élargi) les deux seules betalactamines qui demeurent actives sont : (cocher la réponse juste)

- a. ampicilline et cefotaxime
- ☒ b. oxacilline et ceftriaxone
- c. cefoxitine et Imipenem
- d. Piperacilline et ceftalodine

2. Les souches de Staphylococcus aureus MRSA+ sont résistantes à : (cocher la réponse juste)

- a. Amykacine et Erythromycine
- ☒ b. Oxacilline et cephalosporines (toutes)
- c. Oxacilline et cefazoline
- ☒ d. Oxacilline seule

TAT : Vancomycine + Rifampicine
ou Vancomycine

3. Les poliovirus appartiennent : (cocher réponse juste)

- ☒ a. A la famille de picornaviridae
- b. Sont des virus à A.D.N
- c. Possèdent une symétrie hélicoïdale
- d. Sont enveloppés
- ☒ e. Sont sensibles aux pH acides

4. Les Streptococcaceae sont : (cocher la réponse juste)

- a. sensibles à la gentamicine et résistants à l'amikacine
- ☒ b. résistants à tous les aminosides
- c. sensibles à l'amikacine et résistants à la méthicilline
- d. sensibles à la gentamicine et à l'amikacine

Méthicilline - pénicilline

5. Les Salmonella typhi isolées en Algérie sont : (cocher la réponse juste)

- a. résistants à tous les antibiotiques
- ☒ b. sensibles à tous les antibiotiques
- c. résistants aux quinolones
- d. sensibles aux macrolides

phénicolés, etc.

6. La meilleure prévention des infections nosocomiales reste (Cocher la réponse fausse)

- ☒ a. une antibiothérapie adaptée
- b. une désinfection correcte des plaies opératoires
- c. le lavage des mains chez le personnel soignant
- ☒ d. l'hygiène de l'environnement
- e. le contrôle de la stérilisation

7. L'agent HIV est caractérisé par : (cocher la réponse fausse)

- a. son extrême variabilité génétique
- ☒ b. sa possession d'une transcriptase génétique
- c. sa large diffusion dans le monde
- d. sa transmission par voie sexuelle et sanguine
- ☒ e. sa résistance à la chaleur et à l'eau de javel

8. Pour rechercher un germe anaérobie il faut respecter les règles suivantes : (cocher la réponse fausse)

- a. désinfection locale du site de prélèvement
- b. éviter la pénétration de bulles d'air dans le prélèvement
- c. acheminer le prélèvement en moins d'une heure
- d. prélever avant toute antibiothérapie
- ☒ e. prélever à la seringue ou à l'écouvillon ordinaire

9. Les méningites tuberculeuses sont caractérisées par leur (cocher la réponse juste)

- a. glycorachie normale ou élevée
- b. présence de bacilles Acido Alcoolo Résistants (BAAR) à l'examen direct et/ou à la culture
- ☒ c. absence de réaction cellulaire lymphocytaire avec ou sans polynucléaires
- d. réaction cellulaire avec polynucléaires altérés
- ☒ e. présence d'une protéinorachie effondrée

10. La flore cutanée peut être remplacée par des espèces bactériennes de surinfection lors (cocher la réponse fausse)

- a. d'une infection superficielle
- b. d'un état d'immuno-dépression
- c. d'une utilisation abusive d'antibiotiques
- d. d'une utilisation abusive d'antiseptiques
- ☒ e. d'une infection profonde (abcès fermé)

11. Les bactéries fréquemment responsable de méningite chez le nouveau né sont (cocher la réponse juste)

- a. E. coli
- b. Streptococcus agalactiae
- c. Listeria monocytogenes
- ☒ d. Toutes ces bactéries
- ☒ e. Aucune de ces bactéries

12. La prévention de la poliomyélite des fait (cocher réponse juste)

- a. par la sérothérapie
- b. par chimiothérapie
- ☒ c. par la vaccination
- ☒ d. uniquement par des mesures d'hygiène appropriées
- e. par la sérovaccination